



Compromissione sessuale, emozionale e cognitiva persistente Post-Finasteride: un sondaggio di uomini riportanti i sintomi

Christine Anne Ganzer , Alan Roy Jacobs , Farin Iqbal

Riassunto

Finasteride è un inibitore sintetico della 5- α reduttasi, che impedisce la conversione del testosterone in diidrotestosterone ed è stato utilizzato da oltre 20 anni nel trattamento della perdita di capelli maschile. Prove randomizzate e controllate hanno associato finasteride con effetti negativi sia reversibili che persistenti. In questo studio pilota, abbiamo cercato di caratterizzare gli effetti avversi sessuali e non sessuali che gli uomini hanno riferito di aver sperimentato almeno 3 mesi dopo aver interrotto il farmaco. Sulla base di una precedente ricerca sugli effetti collaterali persistenti di finasteride, abbiamo costruito un'indagine su Internet che ha interessato sei sfere: sintomi fisici, libido sessuale, disturbi eiaculatori, disturbi del pene e dei testicoli, sintomi cognitivi e sintomi psicologici e sono stati inviati via e-mail ai pazienti che hanno provato i sintomi degli effetti collaterali di finasteride. Sono state incluse nell'analisi le risposte di 131 uomini generalmente sani (età media, 24 anni) che avevano preso finasteride per la perdita di capelli maschile. La scoperta più notevole è stata che gli effetti avversi persistevano in ciascuna delle sfere, indicando la possibile presenza di una "sindrome post-finasteride".

- *traduzione in italiano ricerca completa in corso*

[– Persistent Sexual, Emotional, and Cognitive Impairment Post-Finasteride: A Survey of Men Reporting Symptoms. Ganzer, C.A. Am J Mens Health. 2014 Jun 13. pii: 1557988314538445.](#)